

**Tilleggsintervju:**  
**RUSMISBRUK**  
**Kiddie-SADS-PL 2009**

**Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – present-life version  
For School Aged Children (6-18 years)**

---

Intervjupersonens forbokstaver

---

Intervjudato

---

Intervjuer



**NTNU**  
**Det medisinske fakultet**  
**Regionsenter for barn og unges psykiske helse**

**Intervjupersonens navn: ..... Intervjupersonens fødselsdato .....**

**Intervjuer ..... Dato for intervjuet .....**

## **INNHold**

**ALKOHOLMISBRUK.....1**

**STOFFMISBRUK .....7**

## ALKOHOLMISBRUK

1. Negative konsekvenser – skole og arbeid  
(Misbruk symptom nr 1)

*Har du hatt problemer på skolen pga. drikkingen? Har drikkingen påvirket karakterene dine? Har du gjort det dårlig på en eksamen fordi du var for full eller i bakrus til å lese til eksamen? Latt være å gjøre hjemmeoppgaver?*

*Tror du selv at drikkingen går ut over skolearbeidet ditt (gjort at du har fått dårligere karakterer, blitt utvist, ikke overholder regler, sluttet på skolen)? Har noen nevnt at den gjør det? Har du fått vanskeligheter på skolen på grunn av drikkingen? Hvordan?*

**For elever som har arbeid ved siden av skolen:**

*Har drikkingen gått ut over jobben din? Har du vært borte fra jobben fordi du var i bakrus eller drakk? Fått vanskeligheter på jobben fordi du var full eller drakk (fått sparken, blitt degradert)?*

2. Intervjupersonen beruset når han/hun skulle oppfylle viktige rolleforpliktelser  
(Misbruk symptom nr 1)

*Har det hendt at du kom full på skolen eller drakk deg full på skolen? Blitt full eller drukket mens du satt barnevakt? Gått full på jobben eller drukket på jobben? Hvor ofte har det hendt?*

3. Negative konsekvenser – risikofylt atferd  
(Misbruk symptom nr 2)

*Har det hendt at du har gjort noe farlig mens du har drukket? Promillekjøring? Råkjørt i fylla? Har du gjort andre ting når du var full, som du vanligvis ikke gjør? Løpt over jernbanesporet når toget nærmet seg, f.eks.? Tatt en risiko på annen måte?*

### F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger  
1 1 1 Ikke til stede  
2 2 2 Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.  
3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

Tidligere:                       
                  **F**           **B**           **S**

### F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger  
1 1 1 Ikke til stede  
2 2 2 Under terskelnivå: Én eller to ganger.  
3 3 3 Terskelnivå: Tre eller flere ganger.

Tidligere:                       
                  **F**           **B**           **S**

### F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger  
1 1 1 Ikke til stede  
2 2 2 Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger  
3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger

Tidligere:                       
                  **F**           **B**           **S**

4. Negative konsekvenser – lovbrudd  
(Misbruk symptom nr 3)

*Har du gjort noe ulovlig mens du var full? Stjålet en bil? Tjuvlånt biler? Stukket av med bilen? Tatt for promillekjøring, ulovlig oppbevaring av alkohol, være full på offentlig sted? Gjort andre ting som å selge stoff, stjålet noe, drevet med tagging eller hærverk? Andre ting?*

**F B S**

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

Tidligere: \_\_\_\_\_  
                  **F**            **B**            **S**

5. Negative konsekvenser – sosialt  
(Misbruk symptom nr 4)

Har drikkingen noen gang ført til problemer med en kjæreste? Hvor mange ganger?

Har du hatt en alvorlig krangel eller slåss med en venn eller en i familien når du var full eller på grunn av drikkingen? Har du mistet venner fordi du drikker, eller fått problemer i forholdet til andre familiemedlemmer på grunn av drikking? Har du hatt problemer med å komme overens med andre?

Har drikkingen ført til at disse problemene har blitt verre?

**F B S**

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

Tidligere: \_\_\_\_\_  
                  **F**            **B**            **S**

6. Økt toleranse  
(Avhengighet symptom nr 1)

*Hvor gammel var du da du begynte å drikke regelmessig? Hvor mye drakk du vanligvis da?*

*Hvor mye drikker du vanligvis nå? Hvor gammel var du da du begynte å drikke så mye?*

*Må du drikke mye mer nå for å bli like brisen som da du begynte å drikke? Hvor mye må du drikke for å bli brisen? Fem alkoholenheter på en kveld? 50 % mer enn før for å bli brisen?*

*Kan du drikke mye mer enn folk flest uten å bli spesielt full? Hvor mye mer? Har alkoholen mindre effekt på deg nå enn før?*

**F B S**

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Trenger én til to alkoholenheter mer enn da alkoholbruken startet for å oppnå den ønskede ruseffekt
- 3 3 3 Terskelnivå: Trenger tre eller flere alkoholenheter mer enn da alkoholbruken startet for å oppnå den ønskede ruseffekt.

Tidligere: \_\_\_\_\_  
                  **F**            **B**            **S**

**Merk: Da en viss grad av toleranse er en normal fysiologisk prosess ved starten av bruk, skal alkoholavhengighetssymptomet toleranse kun vurderes som oppfylt dersom mengden alkohol som må til for å oppnå rus øker etter en periode med vanlig bruk.**

7. Abstinenser  
(Avhengighet symptom nr 2)
- Har du noen gang «fått skjelven» når du kuttet ned på drikkingen eller sluttet å drikke? Fått virkelig sterk hodepine? Følt deg svært engstelig, deprimert eller irritabel? Hatt vanskeligere for å få sove? Følt deg kvalm? Forbigående hallusinasjoner eller illusjoner?*
- Vanlig bakrus skal ikke skåres.**
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Terskelnivå: Ett eller flere abstinenssymptomer.
- Tidligere:** \_\_\_\_\_  
                          **F**                  **B**                  **S**
8. Brukt alkohol for å lindre abstinensen  
(Avhengighet symptom nr 2)
- «Reparerer» du? Driker du noen ganger for å slippe å være fyllesjuk eller «få skjelven»?*
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Terskelnivå: Minst én gang.
- Tidligere:** \_\_\_\_\_  
                          **F**                  **B**                  **S**
9. Varighet
- Hvor lenge varte (symptomene på alkoholmisbruk/alkoholavhengighet)?*
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Terskelnivå: Noen symptomer i minst én måned.
- Tidligere:** \_\_\_\_\_  
                          **F**                  **B**                  **S**
- 10 Driker mer enn planlagt  
(Avhengighet symptom nr 3)
- Hender det at du sier til deg selv at du skal ta én pils/ett vinglass/et par drinker en kveld – og så blir du full allikevel? Hvor ofte skjer dette?*
- Hva med å drikke hele dagen eller gå på fylla i flere dager?*
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Driker av og til mer enn planlagt.
- 3 3 3 Terskelnivå: Driker ofte (tre eller flere ganger) mer enn planlagt.
- Tidligere:** \_\_\_\_\_  
                          **F**                  **B**                  **S**

- 11 Forsøkt å slutte  
(Avhengighet symptom nr 4)
- Har du noen gang forsøkt å slutte å drikke eller kutte ned på drikkingen? Hvor mange ganger har du forsøkt å kutte ned på drikkingen?*
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Har av og til tenkt på å begrense eller kontrollere alkoholbruken.
- 3 3 3 Terskelnivå: Ett eller flere mislykkede forsøk på å begrense eller kontrollere alkoholbruken.
- Tidligere:**                                      
                                 **F**            **B**            **S**
- 12 Høyt tidsbruk  
(Avhengighet symptom nr 5)
- Hvor mye av tiden din bruker du til å drikke, være full eller i bakrus? Bruker du mye tid på å tenke på å bli full eller på hvor du kan få tak i noe å drikke?*
- Hvor mye tid bruker du på å komme deg etter å ha drukket?*
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Tid brukt til drikkerelaterte aktiviteter begrenset (f.eks. kun i festsammenheng).
- 3 3 3 Terskelnivå: Tid brukt til drikkerelaterte aktiviteter går ut over kun festsammenheng og er til en viss grad til hinder for andre aktiviteter (bruker flere timer per dag).
- Tidligere:**                                 
                                 **F**            **B**            **S**
- 13 Viktige sosiale, arbeids- eller fritidsaktiviteter gis opp eller redusert på grunn av drikking  
(Avhengighet symptom nr 6)
- Har du noen gang hatt en periode hvor du begynte å drikke i stedet for å være på jobb, bruke tid på fritidsaktiviteter, venner, familie eller andre aktiviteter? Gikk du glipp av slike aktiviteter fordi du var fyllesyk? Vil du si at du i det siste har drukket i stedet for å bruke tid på å gjøre andre ting som du pleide å like å gjøre? Som å drive med sport eller andre ting? Har drikkingen tatt over mye av tiden som du pleide å bruke sammen med familie eller venner?*
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Gått glipp av viktige aktiviteter kun en eller to ganger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Gått glipp av viktige aktiviteter tre eller flere ganger.
- Tidligere:**                                      
                                 **F**            **B**            **S**

14 Negative konsekvenser – kroppslige  
(Avhengighet symptom nr 7)

*Har du noen somatiske problemer som kan ha blitt verre som følge av drikkingen?*

*Har legen din noen gang bedt deg om å ikke drikke alkohol, men du gjorde det likevel?*

**F B S**

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

**Tidligere:**

                      
**F B S**

15 Negative konsekvenser – psykologiske  
(Avhengighet symptom nr 7)

*Forandrer humøret ditt seg veldig når du drikker? Blir du lett sinna? Svinger humøret fra høyt oppe til langt nede? Føler du deg deprimert, engstelig, bekymret eller redd når du drikker? Tenker du på å ta livet ditt eller forsøker å gjøre det når du drikker? Blir disse følelsene forsterket når du drikker? Hvor mange ganger har det skjedd?*

**F B S**

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

**Tidligere:**

                      
**F B S**

<p>16. <b><u>Tegn på alkoholmisbruk</u></b>  <b><u>DSM-IV-kriterier</u></b>  (0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)</p> <p>Et maladaptivt mønster av alkoholbruk som fører til klinisk betydningsfullt ubehag eller funksjonssvikt, og som viser seg ved ett (eller flere) av følgende i løpet av en tolv måneders periode:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) gjentatt alkoholbruk som fører til at personen ikke oppfyller viktige rolleforpliktelser på arbeid, i utdanning eller i hjemmet (f.eks. gjentatt fravær eller dårlig arbeidsinnsats knyttet til drikking; fravær på grunn av drikking; utelukkelse, utvisning fra utdanning; forsømmelse av barn eller hjem på grunn av alkoholbruk).</li> <li>(2) gjentatt alkoholbruk i situasjoner der det er fysisk risikabelt (f.eks. kjøre bil eller betjene maskiner under påvirkning av alkohol).</li> <li>(3) gjentatte alkoholrelaterte problemer med rettsvesenet (f.eks. arrestasjoner for støtende atferd under alkoholpåvirkning).</li> <li>(4) fortsatt alkoholbruk til tross for vedvarende eller tilbakevendende sosiale eller interpersonlige problemer forårsaket eller forverret av virkningene av alkohol (f.eks. krangel med familie om følgene av intoksikasjon, slagsmål).</li> </ol>	<p><b>Samlet vurdering</b> <b>NÅ</b></p> <p>0 1 2</p>	<p><b>Samlet vurdering</b> <b>ATE</b></p> <p>0 1 2</p>
<p>17. <b><u>Tegn på alkoholavhengighet</u></b>  <b><u>DSM-IV-kriterier</u></b>  (0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)</p> <p>Et maladaptivt mønster av alkoholbruk som fører til klinisk betydningsfullt ubehag eller funksjonssvikt, noe som viser seg ved tre (eller flere) av følgende kriterier, som har forekommet på et tidspunkt i løpet av samme tolv måneders periode:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) toleranse, definert ved en av de følgende: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) et behov for stadig økende mengde av alkohol for å oppnå rus eller annen ønsket virkning.</li> <li>b) klart nedsatt virkning ved fortsatt bruk av samme mengde substans.</li> </ol> </li> <li>2) abstinens, som viser seg ved en av de følgende: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) abstinenssymptomer som er typiske for alkohol.</li> <li>b) samme (eller en lignende) substans tas for å lindre eller unngå abstinenssymptomer</li> </ol> </li> <li>3) alkohol tas ofte i større mengder eller over lengre enn det som var meningen.</li> <li>4) det er et vedvarende ønske om eller mislykkede forsøk på å begrense eller kontrollere alkoholbruken.</li> <li>5) mye tid brukes på nødvendige aktiviteter for å skaffe alkohol, bruke alkohol, eller komme seg etter virkningene.</li> <li>6) viktige sosiale, arbeids- eller fritidsaktiviteter gis opp eller blir redusert på grunn av alkoholbruk.</li> <li>7) alkoholbruken fortsetter til tross for viten om å ha et vedvarende eller tilbakevendende fysisk eller psykisk problem som sannsynligvis er forårsaket eller forverret av alkohol (fortsett drikking tross viten om at et magesår forverres av alkoholinntak).</li> </ol>	<p><b>Samlet vurdering</b> <b>NÅ</b></p> <p>0 1 2</p>	<p><b>Samlet vurdering</b> <b>ATE</b></p> <p>0 1 2</p>

**NB: Alkoholmisbruk eller alkoholavhengighet kan være forbundet med hvilket som helst av følgende drikkemønstre:**

1. **Daglig inntak av store mengder alkohol,**
2. **fast, høyt alkoholkonsum begrenset til helgene, eller**
3. **lange avholdsperioder avbrutt av rangler med daglig inntak av store mengder alkohol i flere uker eller enda lenger.**



## STOFFMISBRUK

### 1. Negative konsekvenser – skole og arbeid (Misbruk symptom nr 1)

*Har du hatt problemer på skolen pga. bruk av stoff? Har bruk av stoff påvirket karakterene dine? Har du gjort det dårlig på eksamener fordi du var for ruset, i bakrus eller i abstinensstilstand slik at du ikke greide å lese til eksamen? Latt være å gjøre lekser?*

*Tror du selv at stoffbruket ditt går ut over skolearbeidet ditt (gjort at du har fått dårligere karakterer, blitt utvist, ikke overholder regler, sluttet på skolen)? Har noen nevnt at det gjør det? Har du fått vanskeligheter på skolen på grunn av bruk av stoff? Hvordan?*

**For elever som har arbeid ved siden av skolen:** *Har bruk av stoff gått ut over jobben din? Har du vært borte fra jobben fordi du var i bakrus eller i abstinensstilstand? Fått vanskeligheter på jobben fordi du var ruset (fått sparken, blitt degradert)?*

#### Kriterier

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

2. Intervjupersonen i rus når han/hun skulle oppfylle viktige rolleforpliktelser  
(Misbruk symptom nr 1)

*Har det hendt at du kom ruset på skolen eller ruset deg mens du var på skolen? Ruset deg mens du var barnevakt?  
Gått ruset på jobben eller ruset deg på jobben? Hvor ofte har det hendt?*

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser én eller to ganger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser tre ganger eller flere.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

3. Negative konsekvenser – risikofylt atferd  
(Misbruk symptom nr 2)

*Har det hendt at du har gjort noe farlig mens du var ruset? Kjørt bil? Råkjørt? Har du gjort noe annet som du vanligvis ikke gjør? Løpt over jernbanesporet når toget nærmet seg, f.eks.? Tatt en risiko på annen måte?*

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

4. Negative konsekvenser – lovbrudd  
(Misbruk symptom nr 3)

*Har du gjort noe ulovlig mens du var ruset? Stjålet en bil? Tjuvlånt biler? Blitt tatt for å kjøre bil mens du var påvirket, i besittelse av stoff eller vært ruset på offentlig sted? Andre ting som å selge stoff, stjele eller drevet hærverk?*

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

5. Negative konsekvenser – sosialt  
(Misbruk symptom 4)

*Har du hatt problemer med en kjæreste fordi du bruker stoff? Hvor mange ganger?*

*Har du hatt en alvorlig krangel eller slåss med en venn eller en i familien når du var ruset eller på grunn av at du bruker stoff? Har du mistet venner fordi du bruker stoff, eller fått problemer i forhold til noen i familien på grunn av det? Har du hatt problemer med å komme overens med andre mennesker?*

*Har ditt bruk av stoff ført til at disse problemene har blitt verre?*

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

6. Økt toleranse  
(Avhengighet symptom nr 1)

*Hvor gammel var du da du begynte å bruke \_\_\_\_ regelmessig? Hvor mye brukte du vanligvis da?*

*Hvor mye bruker du vanligvis nå? Hvor gammel var du da du begynte å bruke så mye?*

*Må du bruke mye mer \_\_\_\_ nå for å bli like ruset som da du begynte med \_\_\_\_?*

*Hvor mye mer må du bruke for å bli høy? 50 % mer?*

*Kan du bruke mye mer enn folk flest uten å bli spesielt høy? Hvor mye mer? Har \_\_\_\_ mindre effekt på deg nå enn før?*

Kriterier

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Trenger noe mer av stoffet nå for å oppoppnå den ønskede ruseffekt

3 = Terskelverdi: Trenger minst halvannen gang så mye av stoffet nå for å oppoppnå den ønskede ruseffekt

	<b>Førel- dren- per- sonen NÅ</b>	<b>Førel- dren- per- sonen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

7. Abstinenssymptomer  
(Avhengighet symptom nr 2)

Har det hendt at du har følt deg dårlig når du forsøkte å slutte eller kutte ned \_\_\_\_\_?

Skjelving, svetting, diaré, hallusinasjoner, paranoia, søvnløshet, depresjon, angst osv.

Kriterier:

(0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
d. <u>Kokain</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
e. <u>Opiater</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

8. Brukt stoff for å lindre abstinensen  
(Avhengighet symptom nr 2)

[Hvis abstinenssymptomer er nevnt] *Hva gjorde du for å slippe \_\_\_\_\_? Tok du \_\_\_\_\_?*

Hender det noen gang at du tar stoff for å hindre at du blir syk eller \_\_\_\_\_ (f.eks. får skjelvinger)?

Kriterier : Ved én eller flere anledninger  
(0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
d. <u>Kokain</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
e. <u>Opiater</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2



9. Varighet

*Hvor lenge varte (symptomer på stoffmisbruk/-avhengighet)?*

Kriterier:

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Noen symptomer i minst en måned.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
d. <u>Kokain</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
e. <u>Opiater</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

Bruker mer eller lenger enn planlagt  
(Avhengighet symptom nr 3)

*Hender det at du sier til deg selv at du bare skal ta (f.eks. én joint / én stripe osv.) den kvelden, og så ender det med at du tar mye mer enn du hadde tenkt? Hvor ofte skjer dette?*

*Hva med å bruke hele dagen eller gå på ei kule over flere dager?*

Kriterier

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Bruker av og til mer enn planlagt.

3 = Terskelverdi: Bruker ofte (tre eller flere ganger) mer enn planlagt.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

Forsøkt å slutte

(Avhengighet symptom nr 4)

Har du noen gang forsøkt å slutte med eller bruke mindre \_\_\_\_? Hvor mange ganger har du forsøkt? Hva skjedde?

Kriterier:

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelnivå: Forbigående tanker om ønske om å kutte ned eller kontrollere bruk.

3 = Terskelnivå: Et eller flere mislykkede forsøk på å kutte ned eller kontrollere bruk.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

Høyt tidsbruk

(Avhengighet symptom nr 5)

Hvor mye av tiden din bruker du til å bruke \_\_\_\_\_, være ruset eller på nedtur? Bruker du mye tid på å tenke på hvordan du kan få tak i \_\_\_\_\_?

Hvor lang tid bruker du på å komme deg etter å ha brukt \_\_\_\_\_?

Kriterier:

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelnivå: Tid brukt på rus eller på å tenke på stoff har minimal innvirkning på vanlige aktiviteter.

Bruken er i hovedsak begrenset til helgene.

3 = Terskelnivå: Tid brukt på rus eller på å tenke på stoff har moderat til alvorlig innvirkning på vanlige aktiviteter.

Noe bruk midt i uken.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

Viktige sosiale, arbeids- eller fritidsaktiviteter gis opp eller redusert på grunn av stoffmisbruk  
(Avhengighet symptom nr 6)

Har du noen gang hatt en periode hvor du begynte å ruse deg på \_\_\_\_\_ i stedet for å være på jobb, bruke tid på fritidsaktiviteter, venner, familie eller andre aktiviteter? Gikk du glipp av slike aktiviteter fordi du var i bakrus?

Vil du si at du i det siste har brukt \_\_\_\_\_ i stedet for å bruke tid på å gjøre andre ting som du pleide å like å gjøre? Som å drive med sport eller andre ting? Har det å ruse seg tatt over mye av tiden som du pleide å bruke sammen med familie eller venner?

Kriterier

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Viktige aktiviteter unnlatt ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Viktige aktiviteter unnlatt ved tre eller flere anledninger.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

Negative konsekvenser – kroppslige  
(Avhengighet symptom nr 7)

*Har du noen somatiske problemer som kan ha blitt verre som følge av ditt bruk av \_\_\_\_?*  
*Har legen din noen gang bedt deg om å ikke bruke \_\_\_\_, men du gjorde det likevel?*  
*Har du noen gang svimt av? Våknet neste dag og ikke husket hva du gjorde kvelden før?*

Kriterier:

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

Negative konsekvenser – psykologiske  
(Avhengighet symptom nr 7)

*Forandrer humøret ditt seg veldig når du bruker \_\_\_\_\_? Blir du lett sinna? Svinger humøret fra høyt oppe til langt nede? Føler du deg deprimert, engstelig, bekymret eller redd når du bruker \_\_\_\_? Tenker du på å ta livet ditt eller forsøker å gjøre det når du bruker \_\_\_\_? Blir disse humørtilstandene verre når du bruker \_\_\_\_?  
Hvor mange ganger har det skjedd?*

Kriterier :

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	<b>Foreldre- personen NÅ</b>	<b>Foreldre- personen ATE</b>	<b>Barnet NÅ</b>	<b>Barnet ATE</b>	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedi- sin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

**Tegn på stoffmisbruk****DSM-IV-kriterier**

(0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)

A. Et maladaptivt mønster av stoffbruk som fører til klinisk betydningsfullt ubehag eller funksjonssvikt, og som viser seg ved ett (eller flere) av følgende i løpet av en tolv måneders periode:

- (1) Gjentatt stoffbruk som fører til at personen ikke oppfyller viktige rolleforpliktelser på arbeid, i utdanning eller i hjemmet (f.eks. gjentatt fravær eller dårlig arbeidsinnsats knyttet til stoffbruk; fravær på grunn av rus, utelukkelse, utvisning fra utdanning; forsømmelse av barn eller hjem på grunn av stoffbruk).
- (2) Gjentatt stoffbruk i situasjoner der det er fysisk risikabelt (f.eks. kjøre bil eller betjene maskiner under påvirkning av stoff).
- (3) Gjentatte stoffrelaterte problemer med rettsvesenet (f.eks. arrestasjoner for støtende atferd under påvirkning av stoff).
- (4) Fortsatt stoffbruk til tross for vedvarende eller tilbakevendende sosiale eller interpersonlige problemer forårsaket eller forverret av virkningene av stoff (f.eks. krangel med familie om følgene av intoksikasjon, slagsmål).

B. Symptomene har aldri oppfylt kriteriene for stoffavhengighet for denne stoffgruppen.

	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2	0 1 2
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2	0 1 2
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2	0 1 2
d. <u>Kokain</u>	0 1 2	0 1 2
e. <u>Opiater</u>	0 1 2	0 1 2
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2	0 1 2
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2	0 1 2
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2	0 1 2
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2	0 1 2
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2



**Tegn på stoffavhengighet****DSM-IV-kriterier**

(0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)

Et maladaptivt mønster av stoffbruk som fører til klinisk betydningsfullt ubehag eller funksjonssvikt, noe som viser seg ved tre (eller flere) av følgende kriterier, som har forekommet på et tidspunkt i løpet av samme tolv måneders periode:

- 1) Toleranse, definert ved en av de følgende:
  - (1) et behov for stadig økende mengde av stoff for å oppnå rus eller annen ønsket virkning.
  - (1) klart nedsatt virkning ved fortsatt bruk av samme mengde substans.
- 2) Abstinens, som viser seg ved en av de følgende:
  - (1) abstinenssymptomer som er typiske for stoffet.
  - (1) samme (eller en lignende) substans tas for å lindre eller unngå abstinenssymptomer.
- 3) Stoffet tas ofte i større mengder eller over lengre enn det som var meningen.
- 4) Det er et vedvarende ønske om eller mislykkede forsøk på å begrense eller kontrollere stoffbruken.
- 5) Mye tid brukes på nødvendige aktiviteter for å skaffe stoff, bruke stoff, eller komme seg etter virkningene.
- 6) Viktige sosiale, arbeids- eller fritidsaktiviteter gis opp eller blir redusert på grunn av stoffbruk.
- 7) Stoffbruken fortsetter til tross for viten om å ha et vedvarende eller tilbakevendende fysisk eller psykisk problem som sannsynligvis er forårsaket eller forverret av stoff (f.eks. bruker kokain til tross for viten om kokainindusert depresjon).

	<b>Samlet vurdering NÅ</b>	<b>Samlet vurdering ATE</b>
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2	0 1 2
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2	0 1 2
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2	0 1 2
d. <u>Kokain</u>	0 1 2	0 1 2
e. <u>Opiater</u>	0 1 2	0 1 2
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2	0 1 2
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2	0 1 2
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2	0 1 2
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2	0 1 2
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2