

	<b>Risikovurdering for dyp venetrombose hos kirurgiske pasienter</b>	
	Informasjon	Versjon: 1.00
Organisatorisk plassering: Helse Vest RHF regionale dokumenter - Helsefaglige retningslinjer		
Dok. eier: Baard Christian Schem		Dok. ansvarlig: Ranveig Boge

Kirurgiske pasienter inndeles i tre risikogrupper relatert til dyp venetrombose

**Pasienter med liten risiko:**

Pasienter i denne gruppen er under 40 år, har ingen pasientrelaterte eller kirurgisk relaterte risikofaktorer, og vil kreve generell anestesi for mindre enn 30 minutter. Uten profylakse vil risikoen for en proximal venetrombose være under 1 % og risikoen for en fatal lungeemboli være mindre enn 0,01 %.

**Pasienter med moderat risiko:**

Kirurgisk pasienter med moderat risiko inkluderer de som gjennomgår små inngrep, men som har risikofaktorer i tillegg, eller som er i alderen mellom 40 til 60 år og hvor inngrepet vil kreve generell anestesi i mer enn 30 minutter og som ikke har pasientrelaterte eller kirurgisk relaterte risikofaktorer. Uten profylakse vil risikoen for proximal venetrombose være 2 – 4 % og risikoen for fatal lungeemboli være mellom 0,1 til 0,4 prosent.

**Pasienter med høy risiko:**

Høyrisikogruppen inkluderer pasienter over 60 år som gjennomgår større kirurgiske prosedyrer samt de i aldersgruppen mellom 40 til 60 år med pasientrelaterte eller kirurgisk relaterte risikofaktorer. Uten profylakse er risikoen for proximal venetrombose og fatal lungeemboli i denne gruppen beregnet til å være henholdsvis fra 4 til 8 prosent og 0,4 til 0,1 %.