


## PRAKTISK BRUK AV *LIVETS SISTE DAGER*



	VURDERINGER OG FORUTSETNINGER	HVORFOR
<b>1</b>	<b>DØENDE</b>	Kriterier for bruk av planen er at alle mulige reversible årsaker til pasientens tilstand er vurdert og at behandlingsteamet (minimum lege og sykepleier) er enige om at pasienten er døende.
<b>2</b>	<b>KOMMUNIKASJON</b>	Bruk av planen forutsetter kartlegging av pasientens og pårørendes behov og ønsker, og de skal være informert om at pasienten er døende (gjærne supplert med skriftlig informasjon).
<b>3</b>	<b>OPPSTART</b>	Begge kriterier for bruk av planen må være oppfylt og oppstart skal være journalført av lege. Delmålene gjenspeiler en helhetlig tilnærming og fortløpende observasjon, kartlegging og klinisk vurdering av situasjonen.
<b>4</b>	<b>REVURDERING</b>	Bruk av planen skal fortløpende vurderes og alltid revurderes dersom: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tilstanden bedres</li> <li>- tvil, bekymring eller uenighet knyttes til bruken av planen</li> <li>- planen er brukt i inntil tre døgn</li> </ul>
<b>5</b>	<b>FORTSATT BRUKE ELLER AVSLUTTE</b>	Med utgangspunkt i pasientens situasjon og de involverte parters revurdering (som lege skal journalføre): <ul style="list-style-type: none"> <li>- fortsetter bruken av planen inntil ny vurdering eller død</li> <li>- avsluttes bruken av planen og all behandling gjennomgås på nytt</li> </ul>