

Tittel/arbeidstittel på prosedyren: Kompresjon av arteria radialis etter koronar angiografi og perkutan koronar intervensjon (PCI)			
Problemstilling formuleres som et presist spørsmål: <ul style="list-style-type: none"> Hvilken kompresjonsmetode er best/ anbefalt etter radialisprosedyre (koronar angiografi/ PCI)? Hvilken betydning har armposisjon/ stilling for komplikasjoner (blødning, hematoma, armsmerter, venestase) ved bruk av kompresjonsrull etter radialisprosedyre? Gjelder voksne pasienter.			
Hva slags type spørsmål er dette? <input type="checkbox"/> Diagnose <input type="checkbox"/> Etiologi <input type="checkbox"/> Erfaringer <input checked="" type="checkbox"/> Prognose <input checked="" type="checkbox"/> Effekt av tiltak		Er det aktuelt med søk i Lovdata etter lover og forskrifter? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	
P Beskriv hvilke pasienter det dreier seg om, evt. hva som er problemet:	I Beskriv intervensjon (tiltak) eller eksposisjon (hva de utsettes for):	C Skal tiltaket sammenlignes (comparison) med et annet tiltak? Beskriv det andre tiltaket:	O Beskriv hvilke(t) utfall (outcome) du vil oppnå eller unngå:
P Noter engelske søkeord for pasientgruppe/problem	I Noter engelske søkeord for intervensjon/eksposisjon	C Noter engelske søkeord for evt. sammenligning	O Noter engelske søkeord for utfall
Adults with coronary radial artery procedure (coronary angiography procedure and percutaneous coronary intervention, PCI)	Arteria radialis punction/ Radial artery access	Compression Sling Arm raised position/ lowered Wrist movement	Complications: Bleeding Hematoma Venous stasis Arm/ insertion pain Artery occlusion Nerve damage