SYKEHUS	Hemostasedevice	Metode tapeteknikk?	Varighet kompresjon angio	Varighet kompresjon PCI	Heparinangio	Heparin PCI	Heparin-kompr.metode	Ev. regime trykkreduksjon	Sirk.test før prosedyre	Sirk.test etter prosedyre	Komplikasjoner som observeres	Tiltak ved komplikasjoner (blødning/ hematom)	Restriksjoner mobilisering	Fjerning av hemostasedevice	Obs.tid e. fjerning av device før utreise	Informasjon til pasienter
OUS/ Ullevål	TR-band TM		4 timer	4 timer	5000 I.E >50kg:2500 I.E	70-100 I.E/kg	Angio-prosedyre gir mulighet for 2 timer observasjon, men rutinen er 4 t. pga. enkelt for sengepost.	Angio og PCU red. e. 1 time	Ikke omtalt	Ja, ved påsettelse. Ikke beskrevet metode.	Blødning, hematom, smerte, hemostase.	**Forsterket kompresjon, forlenget kompr.tid, skifte til annen kompr.metode**	Ja, info. om å ikke bruke armen.	På sykehus/ hjemme. Pol.kl. pas. har kompr. til dagen etter (lettet på kompr. før utreise)	8-12 timer	Ikke bruke hånden da dette øker blødningsfaren, vektegger pulsåren.
OUS/ Rh	Lepu Medical Radial Artery Compression Tourniquet		2 timer	4 timer	5000 I.E	100 I.E/ kg	Ingen	Angio ua.: trykkred. Innen 1 time og seponeres e. 2-3 t. Angio m/ risiko for blødning/ PCI: trykkred. Innen 1 time, vurderes sep. e. 3-4 timer.	Ikke beskrevet	Klinisk vurdering av hele arm +BT/puls/SpO2 og pas. subjektive opplevelse.	Blødning, hematom, smerte, hemostase, RAO, nerveskade	Forsterket kompresjon, forlenget kompr.tid, skifte til annen kompr.metode, manuell håndkompresjon	Ja, vurderer å begynne med fatle for å gjøre pas. med oppmerksom på betydning av å holde armen i ro.			Arm i ro resten av dagen. Ikke belaste el. bøye håndledd. Ha arm elevert/ bruk fatle når oppegående. Neste 2-3 dager unngå belastning med tunge løft.
Arendal	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart	Ikke svart
Stavanger/ SUS	Kompresjonsrull m/ tape	egenlaget komp.rull, kompresjon ved hjelp av	5 timer	5 timer	40 IE/kg	70 IE/kg	Ingen	Ingen	Nei	Nei	Blødning, hematom, smerte, hemostase	Forsterket kompresjon	Ja, holder armen i ro	Sykehus/ hjemme		Ikke belaste armen de første to dager.
Haukeland US	TR-band + kompr.rull m/tape	5-6 tapestrimler. Første tape midt på rull rett over innstikksted, 2. og 3. tape i kryss. De neste tapene parallellt over rullen slik at hele rullen dekkes. Tr-band til pas m typisk kortisonhud	5	5	5000 IE	7500 IE/kg	ingen	ikke svart	nei	nei	blødning, hematom, smerte, hemostase	forsterket komp.,forlenget komp.tid, skifte til annen metode, håndkompr; Varighet etter behov	ja, ikke bruk arm prosedyredag, forsiktig neste dag. Hele prosedyredagen holdes arm høyt på brystet, skal ikke brukes	sykehus, hjemme/pasient	vanligvis sporadisk, ekstra obs ved blødning v fjerning av rull.	Følg med og meld fra ved blødning i obs.tiden. Pas får skriv om hvor lenge rull skal sitte på, samt hvordan hematom ser ut.
St.Olav hospital	Kompresjonsrull m/ tape		2 timer *)	4 timer	2500-5000 IE	Etter vekt	Doblet kompr.tid PCI	Ikke svart	Ja, Allens test	Nei	Blødning, hematom / ved kompl. tilsyn lege	Forsterket kompresjon, forlenget kompr.tid	Ja, holde hånd i ro/ høyt, oppegående	sykehus	1 time	Hensikt kompresjonstid,
UNN/ Tromsø	Kompresjonsrull m/ tape		4 timer	4 timer	5000 IE	70-100 IE/kg	Ingen	Ingen	Ja, Allens test	Følger puls, farge, smerte	Blødning, hematom, smerte, hemostase, RAO, nerveskade	Forsterket, forlenget kompr.tid, skifter sjelden, håndkompr. 15-20 min.	ja, arm i fatle til dagen etter prosedyren	sykehus	1/2 time. Lik obs.tid for angio og PCI	muntlig og skriftlig informasjon
LHL-klinikkene Feiring	Kompresjonsrull m/ tape ev. Radistop v/ tynn hud	Egenprodusert kompresjonsrull fikseres nokså stramt over innstikksstedet, tre teipremser på 6 cm, en på tvers og to på kryss. En fjerde teipremse festes løst på oversiden av underarmen for å fiksere.	4 timer	4 timer	5000 I.E.	Etter vekt	Ingen	Ved komplikasjoner justeres kompresjon	Ja, Allen test	Nei, kun obs. av venestase, blødning, hematom, smerte,	Blødning, hematom, smerte, sensibilitet, hemostase, farge, temperatur.	Skifter til skinne/ Radistop. Forlenges med 2 timer	Ja, fatle intervensjonsarm. Info. om forsiktiv armbruk.	Sykehus	2 timer for alle.	Holde armen i ro. Være forsiktig med tunge løft i 2 dager.
*) kompresjonsbandasje tas av, rull og tape beholdes																