

Positiv eller usikker Barlow/Ortolani og / eller risikofaktorer (1 førstegradsslektning, ≥ 2 andregradsslektninger, setefødsel/seteleie ila siste trimester, alle fotdeformiteter)

**Ultralyd
hofter**

Før hjemreise fra barsel hvis mulig,
men ikke senere enn 3-4 uker

Normal ultralyd
($\alpha \geq 60^\circ$ og stabil)

$\alpha 50-59^\circ$ og
UL stabil *

$\alpha \geq 60^\circ$ og
UL
lukserbar

$\alpha 50-59^\circ$ og
UL
lukserbar

$\alpha 43-49^\circ$ og
UL stabil**

$\alpha 43-49^\circ$ og
UL
lukserbar

$\alpha < 43^\circ \pm$
UL
stabilitet

Ingen kontroll

**6 ukers alder
UL hofter**

$\alpha \geq 55^\circ$ ***
UL stabil

$\alpha 50-54^\circ$
UL stabil

$\alpha 50-54^\circ$
UL instabil

$\alpha < 50^\circ$

**Pute (3 mndr.),
kontroll m/UL etter
6 ukers behandling
for å evaluere
effekt, og etter 3
mndr. for å vurdere
seponering**


**3 mndrs alder
UL hofter**

Ikke behandlede barn

- ingen bedring UL ifht. 6 uker ($\alpha < 55^\circ$): LIC-ortose
- $\alpha 56-59^\circ$: rtg ved 4,5-6 mndr.
- $\alpha \geq 60^\circ$: ingen ktr.

**Putebehandlede barn ved 3 mndr.,
hhv. etter 3 mndrs. beh:**

- $\alpha \geq 60^\circ$ Seponere pute
- $\alpha 55-59^\circ$ forlenge pute 1 måned.
- $< 55^\circ$: fortsette behandling 2 mndr.



Tönnis & Brunken 1968
Ikke rtg. før 4,5 måneder, og
kun et front bekken bilde!

**Indikasjon behandling og
senere oppfølging, barn > 4,5
mndrs. alder med HD**

AI > 2 SD fra gj.snittsverdi, med
hofte i ledd: LIC-ortose til
normalisering av AI vinkel (ihht
Tönnis & Brunken-se kurve),
men ikke etter 12 måneders
alder.

Første kontroll etter oppstart
av ortose etter 6 uker, deretter
hver 3. måned til normalisering
eller seponering.

Alle putebehandlede:

Rtg. hofter ved 4,5-6
mndrs. alder. Dersom
denne er normal; ingen
ytterligere klinisk / rtg.
kontroll.
Alle som i forløpet har hatt
instabilitet, eller der rtg.
ved 4-6 mndr. ikke er
normal skal ha rtg. ved
1 års alder.
Videre rtg. bekken med
6 mndrs. intervaller, eller
etter behov

*Unntak: Ved massiv familiær opphopning av HD anbefales UL ved 6 ukers alder.

** Dersom tvil om hoften er stabil eller ei, anbefales pute initialt

*** Unntak: Hvis 1. grads-slektning(er) har hatt seinoppdaget HD anbefales kontroll med UL ved 3 måneders alder