

RISIKOFAKTORER

KRYSS AV AKTUELLE RISIKOFAKTORER

ALLE: TVS-N 2-4 timers alder

INGEN RISIKOFAKTORER

Ingen ekstra skåring

Pasient-ID (barnets navnelapp)

Risiko for infeksjon	
Vannavgang > 18 t, ikke adekvat IV AB til mor*	<input type="checkbox"/>
Mor GBS i urin/UVI, ikke adekvat IV AB til mor*	<input type="checkbox"/>
Korioamnionitt (mistenkt)	<input type="checkbox"/>
Maternell (vedvarende) intrapartum temp. > 38°C**	<input type="checkbox"/>
GBS-infeksjon hos mors tidligere barn	<input type="checkbox"/>
Minst 2 separate unormale (gule eller røde) TVS-N	<input type="checkbox"/>

* første dose min. 4 t før forløsning
** tross enkle tiltak som væske, senket temperatur i rom, febernedssettende

TVS-N også 6-8 + 12 + 24 t alder

Føtal distress/asfyksi/intrapartum

pH < 7,05 i navlearterie	<input type="checkbox"/>
BE ≤ -12 mmol/l i navlearterie	<input type="checkbox"/>
Ventilert > 5 minutter	<input type="checkbox"/>
Tykt misfarget fostervann	<input type="checkbox"/>
Apgar < 6 etter 5 min	<input type="checkbox"/>

TVS-N også 1 + 6-8 t alder

Risiko for lavt blodsukker
Følg prosedyre for hypoglykemi

Risiko for lavt blodsukker	
Minst 1 kryss på "føtal distress/asfyksi/intrapartum"	<input type="checkbox"/>
Maternell diabetes	<input type="checkbox"/>
Maternell bruk av beta-blokker	<input type="checkbox"/>
FV > 4700 g	<input type="checkbox"/>
SGA (se tabell)	<input type="checkbox"/>
Født før uke 36	<input type="checkbox"/>

Risiko for lavt blodsukker
Følg prosedyre for hypoglykemiRhesus-immunisering

Obs gulsott og anemi

Mistanke om syndrom

Varsle barnelege

Vakuumforløsning (obs. subgalealt hematom)

Sjekk hodebunn rett etter fødsel + 2-4 t alder

Barn som skal ha legetilsyn UMIDDELBART

Synlig gulsott / over behandlingsgrense < 24 timers alder

Gallefarget oppkast

Apnèer

Mistanke om kramper

Annet nyfødt barn man oppfatter som sykt

SGA-tabell

36 uker	< 2,5 kg
37 uker	< 2,6 kg
38-39 uker	< 2,7 kg
40 uker	< 2,8 kg
41-42 uker	< 2,9 kg

