


TVS-N - Tidlig varslingskår-nyfødte

**RESPONSSKJEMA**

Observasjon	RØD	GUL	HVIT	GUL	RØD
Respirasjon (pust/min)	≤ 25	26 - 29	30 - 60	61 - 79	≥ 80
Pressing		Ja	Nei	Ja	
Postduktal SpO2 (%)	≤ 89	90 - 94	≥ 95		
Puls (slag/min)	≤ 79	80 - 94	95 - 160	161 - 174	≥ 175
Spising (etter første 4 levetimer)			Spiser godt	Spiser dårlig	Spiser ikke
Nevrologi			Normal tonus og atferd	Hypoton / sitrer / irritabel	Svært hypoton / uvekkbar / kramper
Temperatur (°C)	≤ 35,9	36,0 - 36,4	36,5 - 37,5	37,6 - 37,9	≥ 38,0
Bekymring (foreldre/ helsepersonell)		Ja	Nei	Ja	

Blodsukker (mmol/l)	0 - 4 t: ≤ 1,0 4 - 24 t: ≤ 1,4 > 24 t: ≤ 1,9	0 - 4 t: 1,1 - 1,4 4 - 24 t: 1,5 - 1,9 > 24 t: 2,0 - 2,5	0 - 4 t: ≥ 1,5 4 - 24 t: ≥ 2,0 > 24 t: ≥ 2,6		
---------------------	--	--	--	--	--

**Lavt blodsukker:** Se egen prosedyre for oppfølging/tiltak



Barn som har hatt minst to separate unormale (gule eller røde) TVS-N-skår skal skåres videre tilsvarende barn med risikofaktorer for infeksjon

**Hvis du er bekymret for tilstanden til et barn, fortsett overvåkning og tilkall barnelege uavhengig av skåringsverdier.**