

Tilleggsintervju:

SPISEFORSTYRRELSER OG RUSMISBRUK

KIDDIE-SADS - PL

Kiddie –SADS (PL) 2015
Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia- present-life version
For School Aged Children (6-18 years)

Intervjupersonens forbokstaver

Dato for intervjuet

Intervjuer



NTNU
Det medisinske fakultet
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
Psykiske helse og barnevern

Intervjupersonens navn: Intervjupersonens fødselsdato

Intervjuer Dato for intervjuet

SPISEFORSTYRRELSER.....	3
ALKOHOLMISBRUK	6
STOFFMISBRUK.....	13

SPISEFORSTYRRELSER

For en stund siden snakket du om din bekymring for vekten din og spisevanene dine.

Vurder slankemetodene (kryss av for alle punktene som bekreftes):

- Bruker slankepiller
- Bruker laksativer
- Bruker vann drivende piller
- Kaster opp
- Trener mye
- Inntar kun kalorifri væske en hel dag eller mer;
- Begrenser inntak av energi (f.eks mat)

Vurder følgende trekk ved episoder med overspising (kryss av for alle punktene som bekreftes):

- Spiser mye raskere enn vanlig
- Spiser til føler seg ubehagelig mett
- Spiser store mengder mat når ikke føler seg fysisk sulten
- Spiser alene fordi en føler seg skamfull/flau
- Føler seg motbydelig, deprimert eller svært skamfull etter overspising

1. Forstyrret opplevelse av egen kropp

F B S

*Føler du at du er tykk også når alle andre sier til deg at du ikke ser tykk ut? Vil du gjerne være tynnere?
Er det noe sted på kroppen hvor du synes at du er spesielt fet?
Plager det deg at du fremdeles synes du er tykk selv om du har gått så mye ned i vekt?
Mener du at du faktisk har gått ned i vekt, eller er det bare noe som andre synes, men som de tar feil i? Hvordan tar de feil, da?*

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Rapporterer at hun/han føler seg tykk og ofte plages ved tanken på dette, selv om hun/han er klar over at hun/han ikke er tykk etter objektive kriterier.
- 3 3 3 Terskelnivå: Oppfatningen av seg selv som tykk påvirkes ikke av objektive tegn på det motsatte.

Tidligere: _____
 F B S

2. Manglende kontroll

F B S

*Føler du at du ikke har kontroll over spisekickene?
Kan du slutte å spise når du først har begynt?*

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Kan ofte kontrollere trangten til storspising/spiseorgiene eller stoppe når de har begynt (f.eks. minst 50 prosent av gangene).
- 3 3 3 Terskelnivå: Kan kontrollere spisetvangen (spisingen) noen ganger, men vanligvis ikke. Har vanligvis vansker med å stoppe spisingen når først har begynt.

Tidligere: _____
 F B S

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
<p>3. <u>Selvurdering preget av kroppsvekt</u> <i>Føler du at din egenverdi er uløselig knyttet til kroppsvekten din?</i></p>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
<p>4. <u>Varighet</u> <i>Hvor lenge har du hatt spisekicks/spiseorgier? (i uker)</i> <i>Nåværende: ___ ___ ___</i> <i>Tidligere: ___ ___ ___</i></p>						

5. **Tegn på anorexia nervosa**

DSM-5-kriterier

(0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)

A. Restriksjon av energiinntak (f.eks mat) i forhold til behov, som medfører betydelig lav kroppsvekt med tanke på kjønn, alder, utviklingsstadium og fysisk helse (f.eks lav vekt definert som under laveste forventet vekt).

B. Intens frykt for å legge på seg eller bli tykk, eller vedvarende adferd som hindrer vektøkning, selv ved signifikant lav vekt.

C. Forstyrrelse i hvordan kroppens vekt og form oppleves, selvbedømmingen er sterkt preget av kroppsform og vekt, eller vedvarende mangel på innsikt i alvoret i den nåværende lave kroppsvekten.

a. Restriktiv form

I løpet av den aktuelle episoden har pasienten **ikke** hatt regelmessige spiseorgier eller tømningssatferd (dvs. selvpåførte brekninger, eller misbruk av avføringsmidler, diuretika eller klyster).

b. Bulemisk form

I løpet av den aktuelle episoden har pasienten hatt regelmessige spiseorgier eller tømningssatferd (dvs. selvpåførte brekninger eller misbruk av avføringsmidler, diuretika eller klyster).

Spesifiser alvorlighetsgrad (nåværende):

Mild: (BMI > 17): ____ Moderat (BMI > 16-16,99): ____ Alvorlig (BMI > 15-15,99): ____

Ekstrem (BMI < 15):

Spesifiser alvorlighetsgrad (tidligere):

Mild: (BMI > 17): ____ Moderat (BMI > 16-16,99): ____ Alvorlig (BMI > 15-15,99): ____

Ekstrem (BMI < 15):

Kriterier for delvis remisjon: Etter at personen har oppfylt kriteriene for anorexi nervosa, oppfyller personen ikke kriterie A (lav kroppsvekt) i en lengre periode, men kriterie B eller C er fortsatt tilstede.

Kriterier for full remisjon: Etter at personen har oppfylt kriteriene for anorexi nervosa, har ingen av kriteriene vært oppfylt over en lengre periode.

6. **Tegn på overspisingsforstyrrelse**

DSM-5-kriterier

(0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)

A. Gjentatte episoder med overspising. En episode med overspising karakteriseres av begge de følgende:

1. Raskt inntak av matmengder over et begrenset tidsrom (f.eks i løpet av to timer), som er klart større enn det de fleste ville spise i løpet av tilsvarende tid og under lignende omstendigheter.
2. En følelse av ikke å ha kontroll over spisingen i episoden (f.eks en følelse av å ikke kunne slutte å spise eller kontrollere hva eller hvor mye en spiser).

B. Episoder med overspising er assosiert med tre eller flere av følgende: 1) Spiser mye raskere enn vanlig; 2) Spiser seg ubehagelig mett; 3) Spiser store mengder mat uten egentlig å være fysisk sulten; 4) Spiser alene fordi en er flau over hvor mye en spiser; 5) Føler seg motbydelig, deprimentert eller har skyldfølelse etter å ha overspist.

C. Markert ubehag knyttet til overspising

D. Overspiser i snitt minst én gang i uken over tre måneder

E. Overspising er ikke assosiert med uhensiktsmessig kompensatorisk adferd og forekommer ikke kun under episoder med Bulimi eller Anoreksi Nervosa.

Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
------------------------	-------------------------

0 1 2	0 1 2
-------	-------

0 1 2	0 1 2
-------	-------

0 1 2	0 1 2
-------	-------

0 1 2	0 1 2
-------	-------

<p>7. <u>Tegn på Bulemi Nervosa</u> <u>DSM-5-kriterier</u> (0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)</p> <p>A Gjentatte episoder med ukontrollerte spiseorgier. En slik episode er kjennetegnet av <u>begge</u> de følgende: (1) raskt inntak av matmengder over et begrenset tidsrom (f.eks. i løpet av to timer), som er klart større enn det de fleste ville spise i løpet av tilsvarende tid og under lignende omstendigheter. (2) en følelse av ikke å ha kontroll over spisingen i episoden (f.eks. en følelse av å ikke kunne slutte å spise eller kontrollere hva eller hvor mye man spiser).</p> <p>B Gjentatt uhensiktsmessig kompensatorisk atferd som skal hindre vektøkning, slik som selvfremkalte brekninger, misbruk av avføringsmidler, diuretika, klyster eller andre legemidler; faste eller overdreven fysisk aktivitet.</p> <p>C Både spiseorgiene og den uhensiktsmessige kompensatoriske atferden forekommer begge i gjennomsnitt minst to ganger i uken over tre måneder.</p> <p>D Selvvurderingen er sterkt preget av kroppsform og vekt.</p> <p>E Lidelsen forekommer ikke bare under episoder med anoreksia nervosa.</p>	0 1 2	0 1 2
<p>8.. <u>Spesifiser form:</u></p> <p><u>Med selvfremkalt tømning:</u> <i>under den nåværende episoden av bulimia nervosa har personen regelmessig sørget for selvfremkalte brekninger eller misbruk av avføringsmidler, diuretika eller klyster</i></p> <p><u>Uten selvfremkalt tømning:</u> <i>under den nåværende episoden av bulimia nervosa har personen brukt annen upassende kompensatorisk atferd slik som faste eller overdreven fysisk aktivitet, men ikke selvfremkalte brekninger eller misbruk av avføringsmidler, diuretika eller klyster.</i></p> <p>Vurder alvorlighetsgrad av overspisingsforstyrrelse på grunnlag av antall episoder med overspising ilt en uke. Vurder alvorlighetsgrad av bulimi på grunnlag av antall episoder med upassende kompensatorisk adferd i uken.</p> <p>Spesifiser alvorlighetsgrad (nåværende): ___ Mild (1-3) Moderat (4-7): ___ Alvorlig (8-13): ___ Ekstrem (14+): ___</p>	0 1 2	0 1 2
<p>Spesifiser alvorlighetsgrad (tidligere): ___ Mild (1-3) Moderat (4-7): ___ Alvorlig (8-13): ___ Ekstrem (14+): ___</p> <p><i>Kriterier for delvis remisjon, overspisingsforstyrrelse:</i> Etter at kriteriene for overspisingsforstyrrelse er oppfylt, forekommer overspising sjeldnere enn én gang i uken over en betydelig tidsperiode.</p> <p><i>Kriterier for delvis remisjon, bulimi nervosa:</i> Etter at kriteriene for bulimi nervosa er oppfylt, er noen, men ikke alle kriteriene oppfylt i en betydelig tidsperiode.</p> <p><i>Kriterier for full remisjon, begge lidelser:</i> Etter at kriteriene er oppfylt, er ingen av kriteriene oppfylt i en betydelig tidsperiode.</p>		
<p>Spiseforstyrrelse INA Spiseforstyrrelse som ikke oppfyller kriteriene for noen spesifikk spiseforstyrrelse iflg DSM-5, eller utilstrekkelig informasjon).</p>	0 1 2	0 1 2
	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering tidligere

ALKOHOLMISBRUK

1. Drikker mer enn planlagt

Hender det at du sier til deg selv at du skal ta én pils/ett vinglass/et par drinker en kveld – og så blir du full allikevel? Hvor ofte skjer dette?

Hva med å drikke hele dagen eller gå på fylla i flere dager?

F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Drikker mer enn planlagt ved én eller to anledninger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Drikker mer enn planlagt tre eller flere ganger.

Tidligere: _____
 F **B** **S**

2. Innfrir ikke viktige rolleforpliktelser

Har det hendt at du kom full på skolen eller drakk deg full på skolen? Blitt full eller drukket mens du satt barnevakt? Gått full på jobben eller drukket på jobben? Hvor ofte har det hendt?

F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Én eller to ganger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Tre eller flere ganger.

Tidligere: _____
 F **B** **S**

3. Bruk i risikofylte situasjoner

Har det hendt at du har gjort noe farlig mens du har drukket? Promillekjøring? Råkjørt i fylla? Har du gjort andre ting når du var full, som du vanligvis ikke gjør? Løpt over jernbanesporet når toget nærmet seg, f.eks.? Tatt en risiko på annen måte?

F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger
- 3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger

Tidligere: _____
 F **B** **S**

4. Negative konsekvenser – lovbrudd

Har du noen gang blitt arrestert for ordensforstyrrelse eller for å ha slåss når du var full? Har du blitt tatt for promillekjøring, ulovlig oppbevaring av alkohol, være full på offentlig sted? Gjort andre ulovlige ting når du var full som å stjele biler? Stukket av med bilen? Andre ting som å selge narkotika, stjele eller gjøre hærverk?

NB: Ikke registrert som symptom i DSM-5.

F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved to eller flere anledninger.

Tidligere: _____
 F **B** **S**

5. Bruk på tross av sosiale problemer

Har drikkingen noen gang ført til problemer med en kjæreste eller familiemedlem? Hva skjedde?

Har du hatt en alvorlig krangel eller slåss med en venn eller en i familien når du var full eller på grunn av drikkingen? Har du mistet venner fordi du drikker, eller fått problemer i forholdet til andre familiemedlemmer på grunn av drikking? Har du hatt problemer med å komme overens med andre?

Har drikkingen ført til at disse problemene har blitt verre?

F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

Tidligere: _____
 F **B** **S**

6. Økt toleranse

Hvor gammel var du da du begynte å drikke regelmessig? Hvor mye drakk du vanligvis da?

Hvor mye drikker du vanligvis nå? Hvor gammel var du da du begynte å drikke så mye?

Må du drikke mye mer nå for å bli like brisen som da du begynte å drikke? Hvor mye må du drikke for å bli brisen? Fem alkoholenheter på en kveld? 50 % mer enn før for å bli brisen?

Kan du drikke mye mer enn folk flest uten å bli spesielt full? Hvor mye mer? Har alkoholen mindre effekt på deg nå enn før?

F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Trenger én til to alkoholenheter mer enn da alkoholbruken startet for å oppnå den ønskede ruseffekt
- 3 3 3 Terskelnivå: Trenger tre eller flere alkoholenheter mer enn da alkoholbruken startet for å oppnå den ønskede ruseffekt.

Tidligere: _____
 F **B** **S**

Merk: Da en viss grad av toleranse er en normal fysiologisk prosess ved starten av bruk, skal alkoholavhengighetssymptomet toleranse kun vurderes som oppfylt dersom mengden alkohol som må til for å oppnå rus øker etter en periode med vanlig bruk.

7. Abstinenser

Har du noen gang «fått skjelven» når du kuttet ned på drikkingen eller sluttet å drikke? Fått virkelig sterk hodepine? Følt deg svært engstelig, deprimert eller irritabel? Hatt vanskeligere for å få sove? Følt deg kvalm? Forbigående hallusinasjoner eller illusjoner? Har du noen gang drukket eller tatt andre rusmidler for å redusere symptomene?

Vanlig bakrus skal ikke skåres.

F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Terskelnivå: Ett eller flere abstinenssymptomer, eller alkohol eller annet rusmiddel (f.eks. benzodiazepiner) tas for å unngå abstinenssymptomer.

Tidligere: _____
 F **B** **S**

8. Forsøkt å slutte eller redusere bruken

Har du noen gang forsøkt å slutte å drikke eller kutte ned på drikkingen? Hvor mange ganger har du forsøkt å kutte ned på drikkingen?

Har du noen gang «fått skjelven» når du kuttet ned på drikkingen eller sluttet å drikke? Fått virkelig sterk hodepine? Følt deg svært engstelig, deprimert eller irritabel? Hatt vanskeligere for å få sove? Følt deg kvalm? Forbigående hallusinasjoner eller illusjoner?

F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Har av og til tenkt på å begrense eller kontrollere alkoholbruken.
- 3 3 3 Ett eller flere mislykkede forsøk på å begrense eller kontrollere alkoholbruken.

Tidligere: _____
 F **B** **S**

9. Bruker mye tid på rusrelaterte aktiviteter

Hvor mye av tiden din bruker du til å drikke, være full eller i bakrus? Bruker du mye tid på å tenke på å bli full eller på hvor du kan få tak i noe å drikke?

Hvor mye tid bruker du på å komme deg etter å ha drukket?

F B S

- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Tid brukt til drikkerelaterte aktiviteter begrenset (f.eks. kun i festsammenheng).
- 3 3 3 Terskelnivå: Tid brukt til drikkerelaterte aktiviteter går ut over kun festsammenheng og er til en viss grad til hinder for andre aktiviteter. Bruker flere timer per dag, tre eller flere dager i uken, på å skaffe, bruke alkohol eller komme seg etter at en har drukket.

Tidligere: _____
 F **B** **S**

- 10 Viktige sosiale, arbeids- eller fritidsaktiviteter gis opp eller redusert på grunn av drikking
Har du noen gang hatt en periode hvor du begynte å drikke i stedet for å være på jobb, bruke tid på fritidsaktiviteter, venner, familie eller andre aktiviteter? Gikk du glipp av slike aktiviteter fordi du var fyllesyk? Vil du si at du i det siste har drukket i stedet for å bruke tid på å gjøre andre ting som du pleide å like å gjøre? Som å drive med sport eller andre ting? Har drikkingen tatt over mye av tiden som du pleide å bruke sammen med familie eller venner?
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Gått glipp av viktige aktiviteter kun en eller to ganger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Gått glipp av viktige aktiviteter tre eller flere ganger.

Tidligere: F _____ B _____ S _____

- 11 Negative konsekvenser – kroppslige
- Har du noen somatiske problemer som kan ha blitt verre som følge av drikkingen?*
- Har du noen gang skadet deg mens du var full? Hva skjedde?*
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Under terskelnivå: Under terskelnivå: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Terskelnivå: Mindre, negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger (f.eks. mindre skader), eller alvorlige konsekvenser ved én eller flere anledninger (f.eks. skade i ryggrad eller hjerne).

Tidligere: F _____ B _____ S _____

- 12 Negative konsekvenser - psykologiske
- Forandrer humøret ditt seg veldig når du drikker? Blir du lett sinna? Svinger humøret fra høyt oppe til langt nede? Føler du deg deprimert, engstelig, bekymret eller redd når du drikker? Tenker du på å ta livet ditt eller forsøker å gjøre det når du drikker? Blir disse følelsene forsterket når du drikker? Hvor mange ganger har det skjedd?*
- F B S**
- 0 0 0 Ingen opplysninger
- 1 1 1 Ikke til stede
- 2 2 2 Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.
- 3 3 3 Terskelnivå: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

13 Alkoholsug
Har du et sug etter alkohol? At du tenker på å drikke når du er opptatt med å gjøre andre ting? Hvor ofte har du bare lyst til å bli full?

FBS

- 0 0 0 Ingen opplysninger
 1 1 1 Ikke til stede
 2 2 2 Under terskelnivå: Av og til alkoholsug, ikke ofte.
 3 3 3 Terskelnivå: Ofte og vedvarende alkoholsug

Tidligere: _____ F _____ B _____ S

14. Funksjonsnedsettelse
 (0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)

A. Sosialt (med venner)

B. Med familie

C. Skole eller jobb

D. Konsekvenser av lovbrudd

15. Stress/ubehag

Hender det at drikkingen eller noe av det som har skjedd som en konsekvens av drikkingen gjør deg veldig stresset?

16. Varighet (i uker)

Nåværende: _____
 Tidligere: _____
 Lengste periode edru: _____

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
A. Sosialt (med venner)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
B. Med familie	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
C. Skole eller jobb	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
D. Konsekvenser av lovbrudd	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
15. Stress/ubehag	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
16. Varighet (i uker)	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

16. <u>Tegn på alkoholmisbruk</u> <u>DSM-5-kriterier</u> (0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
Et problematisk mønster av alkoholbruk som fører til klinisk betydningsfull funksjonssvikt eller ubehag, og som viser seg ved minst <u>to</u> av følgende i løpet av en tolv måneders periode:	0 1 2	0 1 2
<ul style="list-style-type: none"> (1) Alkohol inntas i større mengder og over en lengre periode enn intendert. (2) Vedvarende sterkt ønske om å slutte eller mislykkede forsøk på å kutte ned på eller kontrollere alkoholbruken. (3) Mye tid brukes på aktiviteter som er nødvendig for å skaffe alkohol, bruke alkohol eller restitueres fra virkningene. (4) Alkoholsug, eller sterkt ønske om eller drift for alkohol, (5) Gjentatt alkoholbruk som fører til at personen ikke oppfyller viktige rolleforpliktelser på arbeid, i utdanning eller i hjemmet. (6) Fortsatt alkoholbruk til tross for vedvarende eller tilbakevendende sosiale eller interpersonlige problemer forårsaket eller forverret av virkningene av alkohol. Viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsaktiviteter gis opp eller reduseres på grunn av alkoholbruk. (7) gjentatt alkoholbruk i situasjoner der det er fysisk risikabelt. (8) Fortsatt alkoholbruk på tross av kjente vedvarende eller gjentatte fysiske eller psykologiske problemer som sannsynligvis skyldes eller er blitt forverret av alkohol. (9) Toleranse, definert som minst én av følgende: a) behov for markert økt mengde alkohol for å oppnå beruselse eller ønsket virkning etter en periode med regelmessig bruk; eller b) En markert redusert virkning ved fortsatt bruk av samme mengde alkohol etter en periode med regelmessig bruk. (10) Abstinens som viser seg ved minst én av følgende: a) De karakteristiske abstinenssymptomene for alkohol; eller b) Alkohol (eller lignende substans, f.eks. benzodiazepiner) tas for å lindre eller unngå abstinenssymptomer. 		

17. I remisjon

Spesifiser:

___ i kontrollerte omgivelser (tilgang på alkohol er begrenset)

___ Tidlig remisjon (etter at kriteriene har vært oppfylt, er ingen av kriteriene under A (1-11) oppfylt over en periode på minst tre, men mindre enn tolv måneder.

___ Vedvarende remisjon (etter at kriteriene har vært oppfylt, har ingen av kriteriene under A (1-11) på noe tidspunkt vært oppfylt over en periode på tolv måneder eller mer.

Spesifiser alvorlighetsgrad (nåværende):

___ Mild (2-3 symptomer) ___Moderat (4-5 symptomer) ___ Alvorlig (6+ symptomer)

Spesifiser alvorlighetsgrad (tidligere):

___ Mild (2-3 symptomer) ___Moderat (4-5 symptomer) ___ Alvorlig (6+ symptomer)

NB: Alkoholmisbruk kan være forbundet med hvilket som helst av følgende drikkemønstre:

1. **Daglig inntak av store mengder alkohol,**
2. **fast, høyt alkoholkonsum begrenset til helgene, eller**
3. **lange avholdsperioder avbrutt av rangler med daglig inntak av store mengder alkohol i flere uker eller enda lenger.**

STOFFMISBRUK

1. Bruker mer eller lenger enn planlagt

Hender det at du sier til deg selv at du bare skal ta (f.eks. én joint / én stripe osv.) den kvelden, og så ender det med at du tar mye mer enn du hadde tenkt? Hvor ofte skjer dette?

Hva med å bruke hele dagen eller gå på ei kule over flere dager?

Kriterier

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Bruker av og til mer enn planlagt.

3 = Terskelverdi: Bruker ofte (tre eller flere ganger) mer enn planlagt.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

2. Intervjupersonen oppfyller ikke viktige rolleforpliktelser

*Har det hendt at du kom ruset på skolen eller ruset deg mens du var på skolen? Ruset deg mens du var barnevakt?
Gått ruset på jobben eller ruset deg på jobben? Hvor ofte har det hendt?*

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: En eller to ganger.

3 = Terskelverdi: Tre ganger eller flere.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

3. Bruker i fysisk risikofylte situasjoner

Har det hendt at du har gjort noe farlig mens du var ruset? Kjørt bil? Råkjørt? Har du gjort noe annet som du vanligvis ikke gjør? Løpt over jernbanesporet når toget nærmet seg, f.eks.? Tatt en risiko på annen måte?

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

4. Negative konsekvenser – lovbrudd

NB: Ikke angitt som symptom i DSM-5

Har du gjort noe ulovlig mens du var ruset? Stjålet en bil? Tjuvlånt biler? Blitt tatt for å kjøre bil mens du var påvirket, i besittelse av stoff eller vært ruset på offentlig sted? Andre ting som å selge stoff, stjele eller drevet hærverk?

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved to eller flere anledninger.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

5. Bruk på tross av sosiale problemer

Har du hatt problemer med en kjæreste fordi du bruker stoff? Hvor mange ganger?

Har du hatt en alvorlig krangel eller slåss med en venn eller en i familien når du var ruset eller på grunn av at du bruker stoff? Har du mistet venner fordi du bruker stoff, eller fått problemer i forhold til noen i familien på grunn av det? Har du hatt problemer med å komme overens med andre mennesker?

Har ditt bruk av stoff ført til at disse problemene har blitt verre?

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

6. Økt toleranse

Hvor gammel var du da du begynte å bruke ____ regelmessig? Hvor mye brukte du vanligvis da?

Hvor mye bruker du vanligvis nå? Hvor gammel var du da du begynte å bruke så mye?

Må du bruke mye mer ____ nå for å bli like ruset som da du begynte med ____?

Hvor mye mer må du bruke for å bli høy? 50 % mer?

Kan du bruke mye mer enn folk flest uten å bli spesielt høy? Hvor mye mer? Har ____ mindre effekt på deg nå enn før?

Kriterier

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Trenger noe mer av stoffet nå for å oppnå den ønskede ruseffekt

3 = Terskelverdi: Trenger minst halvannen gang så mye av stoffet nå for å oppnå den ønskede ruseffekt

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sove medisiner</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

7. Abstinenssymptomer

Har det hendt at du har følt deg dårlig når du forsøkte å slutte eller kutte ned _____?

Skjelving, svetting, diaré, hallusinasjoner, paranoia, søvnløshet, depresjon, angst osv.

Kriterier

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Terskelverdi: Bekrefter ett eller flere abstinenssymptomer.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
d. <u>Kokain</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
e. <u>Opiater</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

8. Forsøkt å slutte eller redusere bruken

Har du noen gang forsøkt å slutte med eller bruke mindre ____? Hvor mange ganger har du forsøkt? Hva skjedde?

Kriterier:

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelnivå: Forbigående tanker om ønske om å kutte ned eller kontrollere bruk.

3 = Terskelnivå: Et eller flere mislykkede forsøk på å kutte ned eller kontrollere bruk.

Har du noen gang forsøkt å slutte med eller bruke mindre ____? Hvor mange ganger har du forsøkt? Hva skjedde?

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
d. <u>Kokain</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
e. <u>Opiater</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

9. Bruker mye tid på rusrelaterte aktiviteter

Hvor mye av tiden din bruker du til å bruke _____, være ruset eller på nedtur? Bruker du mye tid på å tenke på hvordan du kan få tak i _____?

Hvor lang tid bruker du på å komme deg etter å ha brukt _____?

Kriterier:

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelnivå: Tid brukt på rus eller på å tenke på stoff har minimal innvirkning på vanlige aktiviteter. Bruken er i hovedsak begrenset til helgene.

3 = Terskelnivå: Tid brukt på rus eller på å tenke på stoff har moderat til alvorlig innvirkning på vanlige aktiviteter. Noe bruk midt i uken.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

10 Viktige sosiale, arbeids- eller fritidsaktiviteter gis opp eller redusert på grunn av stoffmisbruk

Har du noen gang hatt en periode hvor du begynte å ruse deg på ____ i stedet for å være på jobb, bruke tid på fritidsaktiviteter, venner, familie eller andre aktiviteter? Gikk du glipp av slike aktiviteter fordi du var i bakrus?

Vil du si at du i det siste har brukt ____ i stedet for å bruke tid på å gjøre andre ting som du pleide å like å gjøre? Som å drive med sport eller andre ting? Har det å ruse seg tatt over mye av tiden som du pleide å bruke sammen med familie eller venner?

Kriterier

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Viktige aktiviteter unnlatt ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Viktige aktiviteter unnlatt ved tre eller flere anledninger.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

11 Negative konsekvenser – kroppslige

Har du noen somatiske problemer som kan ha blitt verre som følge av ditt bruk av ___?

Har legen din noen gang bedt deg om å ikke bruke _____, men du gjorde det likevel?

Har du noen gang svimt av? Våknet neste dag og ikke husket hva du gjorde kvelden før?

Kriterier:

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

12 Negative konsekvenser – psykologiske

*Forandrer humøret ditt seg veldig når du bruker _____? Blir du lett sinna? Svinger humøret fra høyt oppe til langt nede? Føler du deg deprimert, engstelig, bekymret eller redd når du bruker ____? Tenker du på å ta livet ditt eller forsøker å gjøre det når du bruker ____? Blir disse humørtilstandene verre når du bruker ____?
Hvor mange ganger har det skjedd?*

Kriterier :

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Negative konsekvenser ved en eller to anledninger.

3 = Terskelverdi: Negative konsekvenser ved tre eller flere anledninger.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
k. <u>Andre</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3

Opplever du at du har et sug etter ___ ? Tenker du på å bruke når du er opptatt med å gjøre andre ting? Hvor ofte har du bare lyst til å bli høy?

Kriterier:

0 = Ingen opplysninger

1 = Ikke til stede

2 = Under terskelverdi: Forbigående og sjeldent sug etter rus.

3 = Terskelverdi: Ofte og vedvarende sug etter rus.

	Foreldre- personen NÅ	Foreldre- personen ATE	Barnet NÅ	Barnet ATE	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
d. <u>Kokain</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
e. <u>Opiater</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

14. Funksjonssvikt

0 = Ingen opplysninger

1 = Nei

2 = Ja

Sosialt (med venner)

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Familie

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Skole eller arbeid

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Konsekvenser av lovbrudd

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

15. Stress/ubehag

Hender det at bruken eller noe av det som har skjedd som en konsekvens av bruken gjør deg veldig stresset?

16. Varighet (i uker)

Nåværende ___ Tidligere: ___ Lengste periode rusfri: ___

17. **Tegn på stoffmisbruk**

DSM-5-kriterier

(0=ingen opplysninger, 1=nei, 2=ja)

A. Et problematisk mønster av stoffbruk som fører til klinisk betydningsfullt ubehag eller funksjonssvikt, og som viser seg ved to (eller flere) av følgende i løpet av en tolv måneders periode:

1. Stoff inntas i større mengder og over en lengre periode enn det som var meningen.
2. Vedvarende sterkt ønske om å slutte eller mislykkede forsøk på å kutte ned på eller kontrollere stoffbruken.
3. Mye tid brukes på aktiviteter som er nødvendig for å skaffe stoff, bruke stoff eller komme seg etter virkningene.
4. Russug, eller sterkt ønske om eller drift for stoff.
5. Gjentatt stoffbruk som fører til at personen ikke oppfyller viktige rolleforpliktelser i arbeid, utdanning eller hjemme.
6. Fortsatt stoffbruk til tross for vedvarende eller tilbakevendende sosiale eller mellommenneskelige problemer forårsaket eller forverret av virkningene av stoff.
7. Viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsaktiviteter gis opp eller reduseres på grunn av stoffbruk.
8. gjentatt stoffbruk i situasjoner der det er fysisk risikabelt.
9. Stoffbruken fortsetter til tross for viten om å ha et vedvarende eller tilbakevendende fysisk eller psykisk problem som er forårsaket eller forverret av stoff
10. Toleranse.
11. Abstinens.

18. **Spesifiser alvorlighetsgraden av stoffmisbruk (nåværende/tidligere)**

0. Ingen diagnose; 1. Mild (2-3 symptomer); 2. Moderat (4-5 symptomer); 3. Alvorlig (6+ symptomer)

A. Cannabis D. Kokain G. Hallusinogener

B. Stimulantia E. Opiater H. Sniffestoffer (løsemidler)

B. Beroligende tabletter og sovemedisin F. PCP I. Andre (spesifiser)

J. Bruk av flere stoffer

19. Remisjonsstatus (spesifiser)

Spesifiser:

0; I kontrollerte omgivelser (tilgang på stoff er begrenset);

1; Tidlig remisjon (etter at kriteriene har vært oppfylt, er ingen av kriteriene under A (1-11) oppfylt over en periode på minst tre, men mindre enn tolv måneder;

2; Vedvarende remisjon (etter at kriteriene har vært oppfylt, har ingen av kriteriene under A (1-11) på noe tidspunkt vært oppfylt over en periode på tolv måneder eller mer.

	Samlet vurdering NÅ	Samlet vurdering ATE
a. <u>Cannabis</u>	0 1 2	0 1 2
b. <u>Stimulantia</u>	0 1 2	0 1 2
c. <u>Beroligende tabletter og sovemedisin</u>	0 1 2	0 1 2
d. <u>Kokain</u>	0 1 2	0 1 2
e. <u>Opiater</u>	0 1 2	0 1 2
f. <u>Fencyklidin</u>	0 1 2	0 1 2
g. <u>Hallusinogener</u>	0 1 2	0 1 2
h. <u>Ecstasy</u>	0 1 2	0 1 2
i. <u>Sniffestoffer (løsemidler)</u>	0 1 2	0 1 2
j. <u>Anabole steroider</u>	0 1 2	0 1 2
k. <u>Andre</u>	0 1 2	0 1 2
l. <u>Bruk av flere stoffer</u>	0 1 2	0 1 2